veue Le 4 fevrier 1758

hernie avec pourriture par m. bardouillere chir. à muonfort sur bitl en normandie

Le 27 aoust 1757 jai été appellé pour voir La Mere de Monsieur Le Bouché demeurant a Routot attaquée depuis 8 jours ~~dun~~ d'étranglement d'une hernie inguinalle de la grosseur de deux poings, elle vomissoit peu elle avoit été a la Selle, je crû que Les Matieres fecales qui etoient Sorties ne venoient que de dessous L'étranglement et des gros intestins j'apperçu a La partie inferieure de la tumeur qui descendoit Entre les deux cuisses et qui couvroit et cachoit la vulve, En passant par dessus L'os pubis ayant relevé la tumeur et l'avoir Examinée je trouvai une flictainne En sa partie inferieure de couleur violette. je dis au fils de la Malade quil y avoit lieu de craindre La Gangrêne; mais vû la grandeur de la tumeur qui avoit commencé depuis plus de 15 ans, quoi quelle rentroit au grés de la Malade, Les autres fois, quon Seroit obligé d'y faire l'operation quil falloit Mettre un cataplasme fait avec Les 4 farines dans une decoction Emmolhente que je fis Sur le champs et fis prendre des clysters et ~~fis~~ une saignée au bras et ~~fis~~ avaler a la Malade de l'huile d'olive au defaut d'huile d'amande douce. on ne fit quune partie de ce qui avoit Été conseillé le 31 je fus revoir la Malade je trouvai a L'indroit de la flictainne une playe pale et La peau macerée je joignis les plantes aromatiques aux Emmolhente et la farine d'orge n'ayant pas sur le lieu Les farines Resolutives, j'ajoutai l'huille de lin dans les clysters et fis prendre L'huille d'amandes douces melés avec du vin a la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d 18 n° 23

2

a la Malade, le stirax en Emplatre fus
mis usage sur la playe et pardessus un Cataplasme
avec le vin aromatique pour Resister au progrés
de la Gangrene dans La partie malade malgrés
Ces Remedes le 4 7bre ayant apperceû que toute la
peau qui recouvroit l'intestin du côté de la cuisse
etoit Macerée dans divers Endroits quil sortoit
du pus Blanc de dessous les teguments, je pris ma
sonde Creuse pour dilater je reconnu que l'intestin
Etoit sphacellé et percé En un Endroit, il me fus
impossible de pouvoir aller debrider l'anneau
a Cause des adherences que les parties avoient
Contractées j'enlevai plusieurs portions de Membranes
d'intestins qui etoient sphacellées Les jours
suivant jus-quau 7 dud. mois je conseillai
des clysteres : le pouls se soutenoit toujour, il n'y
avoit point de hoquets, ny de vomissements
le 9 ayant jugé a propos de charcher les
Extremitez de l'intestin pour faire Ensorte de les
ajuster soit en les cousant ou les entrer l'un
dans l'autre ; je dilatai l'anneau ce que je n'avois
pû faire jus-quà ce jour j'ouvri un Rameau
d'artere qui fourni du sang dans le moment de
La dilatation mais au moyen d'un peu de
charpie Boutte le sang fut arreté si le sang
n'eut pas été arreté par ce moyen je me serois
servi d'un petit morceau d'agaric de chêne ; je ne
pû parvenir a faire ce que je mettois proposé
a cause

JC

a Cause que la portion d'intestin qui sortoit par
L'anneau etoit adherente par sa partie posterieure
aux parties voisines, ainsi je fus contraints d'attendre
La suppuration; comme le malade ne rendoit point
d'excremens de l'intestin et que je ne pouvois en
trouver aisement L'orifice a cause de L'adherence
que L'a portion de l'intestin sphacellée senfoncoit
derriere un autre replis d'intestin qui etoit sain
alors je fus obligé d'attendre La suppuration & la
separation de ce qui etoit mort d'avec Le vif;
cependant j'emportois a chaque pansement tout
ce que je pouvois de Lambeaux & de membranes
corrompües & pouries qui occasionnoient une odeur
tres fetides je mis le digestif animé en usage
le 13 7bre je me servis d'Esprit de Therebentine
Je jeus grand soin de voir si les adherences me
permettroient de tirer l'intestin & importer tout
ce qui etoit alteré et me servi d'une injection
d'esprit de Therebentine par lanneau mêle avec
un peu de vin,

Le 15 du d. mois, le malade reçu un lavement
d'eau & de vin la playe n'exalloit plus une odeur
si fetide; je ne vis sortir de la playe aucune
matieres fecales le malade n'etoit point
alteré, le ventre n'etoit point tendu, la playe
rendoit un pus Blanc et d'une assez bonne Consistance
Le 18 ~~intestin~~ le Replis d'intestin sain qui a
sortoit de la Longueur de trois a quatre pouces,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

4

fus reduit dans labdoment ; javois cru jus-qualors
a cause des adherences que cette portion dintestin
etoit continue a celui que javois emporté, mais
point du tout cetoit une autre portion dintestin
qui avoit sorti par lanneau ainsi il y avoit
double hernie, je veus dire quil y avoit deux
replies dintestin qui sortoient par lanneau
cette portion saine etoit située antérieurement
et lautre qui etoit gangrenée sortoit postérieurement

Le 21 La suppuration continuoit a se bien
faire je maintins lintestin rentré au moyen
dune tente a tete garnie dun fil asses longue
et asses grosse pour entretenir lanneau dilaté
tant pour entretenir une libre issue aux humeurs
qu'aux injections que je faisois. La malade
fut purgée avec deux onces de manne elle
fut une fois a la selle et le 26 elle en reprit
encore ℥ij elle rendit beaucoup dhumeurs
par la playe et le 27 il sortit par la playe
des matieres fecales

Le 30 7bre elle rendit plusieurs vents par
La playe, il me paru une adherence de lintestin
vers le haut de lanneau, la malade avoit appetit
et mangeoit Les jours suivants la playe fut
de meme et lanneau se retrecissoit le 8. 8bre
il sorti des matieres fecales par la playe en
petite quantité [illegible] ce qui me donna Esperance

S

que les Matieres fecalles prendroient Leurs

Cours par L'anus je fus revoir la maladeet

lui consella de se repurger, mais on n'en fit

rien les matieres ont reprit la voies de l'anus

La malade mengeoit et avoit appetit, le 27

9bre je lui reppetai quil fallait se purger et

elle Le fut le jour suivant et le ~~9bre~~

deux 9bre elle fut guerie Radicalement

et s'est toujours bien portée depuis ce temps

a quelques douleurs pres quelle a sentie vers

L'anneau ce qui pourroit venir des adherence

ou de Replie de l'jntestin sain qui a été

reduit et peut être bien de la cicatrice et

de la réunion de celui qui a été gangrenée

ainsi que vous l'avez si bien et si scavament

demontré dans les Memoirs de l'Academie

jl auroit été suivant vous plus sur de faire

un anus artificiel mais quant je l'aurois

voulu jl ne m'auroit pas été possible puisque

je n'ai pu trouver le moyen d'attirer les

Extremitez de l'jntestin gangrenée a cause

des adherences quelles avoient contractees aux

parties voisines; dans cette embaras et celui

que j'avois jus-quou s'ettendoit la mortification

de l'intestin qui pouvoit gagner bien loing
audela de l'anneau ainsi que M.r De La
Peyronnie la rapporté dans les memoirs de
l'academie T.4 page 173 ou il tira hors
du ventre l'intestin qui etoit Gangrené plus de deux
pouces au dela de l'anneau, par consequent il y a
des hernies avec pouritures ou il y a un second
replis d'intestin qui est sain qui a quelquefois
contracté par l'inflamation des adherences qui
se dissipent par la suppuration dans ce cas il
me paroit absolument necessaire de dilater l'anneau
pour faire rentrer cette portion ou replie d'intestin
dans l'Abdomen or il me paroit que ce cas n'a
point encore été expliqué dans votre memoir
puisque vous dite tome VIII page 45 : que la
dilation n'est recommandée en général dans l'operation
de la hernie que pour faciliter la reduction des
parties etranglées : dans la hernie avec pourriture
et adherence il n'y a point de reduction a faire
il n'y a plus d'etranglement &c
il est vrai quil n'y a plus d'etranglement
mais il faut rentrer l'intestin quand les adherences
sont dissipées ainsi que je l'ai fait : je souhaitte
avoir trouvé un fait singulier et que vous trouviés
que mes reflexions mes raisons de ma pratique soit
de votre goût je me ferai un vrai plaisir de recevoir
vos avis et vos conseils en vous communiquant

7 tout Les faits de pratiques qui pouront me tomber
Entre Les mains

il y a lieu de croire suivant Les differentes raison
de vôtre memoire quil n'y auroit eu qu'une portion
d'intestin de Gangrene et que tout le canal
n'auroit pas Eté descendüe si cela étoit il auroit
fallu que Les tuniques de L'intestin se fusent
petit a petit dilatées pour descendre jusqu'a
couvrir La vulve cela ne seroit pas surprenant
on scai combien Les parties Menbraneuses sont
capables d'extention; voici tout ce que j'ai pû
faire et observer afin de vous le communiquer
je desirerois que mes foibles Lumieres et mes petites
observations fussent dignes de vous être presentées
et a vos illustres et scavants Accademiciens je
ferois mes Efforts pour me rendre dignes de
Leurs approbations et ~~f~~ un devoir de suivre
Leur lumieres

Si vous trouvez quelque chose a me marquer mon
adresse est a Montfort sur Rille par le ponteaudemer
En Normandie

j'aurai Encore deux observations a vous Envoyer au
sujet de deux hydropisies accompagnées de suppuration
dans L'abdomen je n'ai point eu Le temps de vous
Les Envoyer ce sera pour un autre moment

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

no. 60 R

Remis au
gagnant